CONSEILS APRÈS UNE SÉANCE DE CRYOLIPOLYSE

Une évolution progressive, sans éviction habituelle

La cryolipolyse améliore un bourrelet localisé. Elle ne remplace ni une perte de poids ni une hygiène de vie adaptée.

1 Des réactions transitoires sont possibles

Rougeur, gonflement, ecchymose, sensibilité, tiraillement ou diminution de la sensibilité peuvent persister plusieurs jours, parfois davantage.

2 Reprenez une vie normale

Les activités habituelles sont généralement possibles le jour même, selon votre confort et les conseils reçus.

3 Laissez du temps au résultat

L'évolution débute souvent après quelques semaines. Le résultat s'évalue plus clairement vers 12 semaines. Stabilisez votre poids.

4 Contactez le cabinet si nécessaire

Signalez une douleur intense ou persistante, une cloque, une modification cutanée, ou une zone ferme qui augmente de volume dans les semaines ou mois suivants.

Dr Stéphan ALONGI

Spécialiste en chirurgie • Phlébologie • Médecine esthétique


071 21 44 53 • 0477 91 59 54 • www.asmedical.be



1. Rougeur, sensibilité ou engourdissement peuvent être transitoires.




2. Reprenez vos activités habituelles selon votre confort.





Dr Stéphan Alongi

3. Le résultat est progressif et s’évalue surtout vers 12 semaines.



4. Douleur persistante ou masse ferme qui augmente : contactez le cabinet.